

Definitionen zur Erfassung der Antibiotikaaanwendung

Brar Piening



Auf der Grundlage des
ECDC Point Prevalence
Surveys zu nosokomialen
Infektionen und
Antibiotika-
anwendung in Europa

Erfassungsbogen P. Patient

Patient erhält Antibiotika: Nein Ja

Bei dem Patient besteht eine NI: Nein Ja

Antibiotikum [CT#4]	Gabe [CT#9]	Indikation [CT#3]	Diagnose (Lokalisation) [CT#2]	Indikation dokumentiert [J/N]
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(*1) Relevante Device Anwendung (Intubation wg. Pneumonie, ZVK/PVK bei Sepsis, Harnblasenkatheter bei HWI) innerhalb 48 h vor Beginn der Infektion (auch bei intermittierendem Gebrauch), 7 Tage für HWI;
Ja -> J
Nein -> N
Unbekannt -> X

(*2) Nur für Infektionen die nicht bei Aufnahme bestanden [TT.MM.JJJJ]

- **ANTIBIOTIKUM:** numerischer Code aus Codiertabelle 4; z. B. 103 für Ceftriaxon.
- Folgende Klassen werden eingeschlossen:
 - Antibiotika zur systemischen Anwendung,
 - Antimykotika zur systemischen Anwendung
- ***Achtung!*** Marken-, Handels- und Substanznamen für sollen in numerische Codes übersetzt werden.

Verabreichungsweg der antimikrobiellen Substanz (Codiertabelle 9):

- **P**: Parenteral
- **O**: Oral
- **R**: Rektal
- **I**: Inhalation.

- ***Behandlung:***
 - **CI**: ambulant erworbene Infektion
 - **LI**: erworben in Langzeit/Kurzzeitpflege (z. B. Pflegeheim) oder im Krankenhaus der Langzeitversorgung
 - **HI**: akute nosokomiale Infektion
- ***Perioperative chirurgische Prophylaxe:***
 - **SPA**: Einzelgabe
 - **SPB**: Gabe für einen Tag
 - **SPC**: Gabe für mehr als einen Tag.
- **MP**: andere Prophylaxe
- **O**: andere Indikation (z. B. Erythromycin als Prokinetikum)
- **UI**: unbekannte Indikation

Prüfen, ob zwischen 8:00 Uhr des Vortags der Erhebung und 8:00 des Erhebungstags eine Gabe erfolgt ist (verordnet wurde)

wenn ja, retrospektiv prüfen, ob die Substanz auch am vorhergehenden Tag wurde oder am Tag der Erhebung verabreicht wird

→ Dauer festzulegen (SPA, SPB, SPC)

Diagnose (Lokalisation)

- Diagnosegruppe nach anatomischer Lokalisation aus Codiertabelle 2.
- Soll nur bei Infektionsbehandlung, nicht bei Prophylaxe oder anderen Indikationen erfasst werden (in letzteren Fällen Code **NA** angeben).
- ***Achtung!*** Hier ist die (dokumentierte oder mündlich preisgegebene) *Meinung des behandelnden Arztes* gefragt.

Indikation dokumentiert



Angeben ob die Indikation für die Anwendung der Antibiotika in den Patientenunterlagen dokumentiert wurde

Ja oder Nein