

gültig ab: 01.01.2017

Kürzel: **SECC** Name der Indikator-OP-Art: **Sectio Caesarea**

Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2017)

- 5-740 Klassische Sectio caesarea
- 5-741 Sectio caesarea, suprazervikal und korporal
- 5-742 Sectio caesarea extraperitonealis
- 5-749 Andere Sectio caesarea
 - 5-749.0 Resectio
 - 5-749.1 Misgav-Ladach-Sectio

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen der CDC
Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:
 - 1 (aseptisch) → wegen Eröffnung des Urogenitaltraktes nicht möglich
 - 2 (bedingt aseptisch)
 - Normalfall – Fruchtblase nicht eröffnet, keine mütterlichen Infektionszeichen
 - 3 (kontaminiert)
 - offene Fruchtblase, keine mütterlichen Infektionszeichen
 - 4 (septisch)
 - Mütterliche Infektionszeichen (z.B. Fieber, Leukozytose, CRP-Erhöhung, trübes oder übelriechendes Fruchtwasser)

Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage

Erfassung der Infektionen:

Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen (ehemals CDC-Definitionen):

- A1 (oberflächliche post-op. WI):
 - Erfasst nur Haut und/oder subcutanes Fettgewebe
- A2 (tiefe post-op. WI):
 - Erfasst Faszien- und/oder Muskelgewebe
 - Exklusive Endometritis
- A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):
 - Inklusive Endometritis und/oder Peritonitis