

D1
Symptomatische Harnwegsinfektion bei ≤ 1 Jahr Lebensalter

Vorliegen eines positiven Urinbefundes

<p>eine Urinkultur $\geq 10^5$ Kolonien/ml Urin mit nicht mehr als zwei Spezies von Mikroorganismen</p>	oder	<p>Urinkultur mit $> 10^3$ und $< 10^5$ Kolonien / ml Urin mit nicht mehr als zwei Spezies von Mikroorganismen</p> <p style="text-align: center;">und</p> <p>Urinuntersuchung zeigt mindestens einen der folgenden Befunde</p> <ul style="list-style-type: none">○ Harnteststreifen für Leukozytenesterase und/oder Nitrit positiv○ Pyurie (≥ 10 Leukozyten/mm³ oder > 3 Leukozyten/Gesichtsfeld bei starker Vergrößerung im nicht-zentrifugierten Urin).○ Bei Gram-Färbung einer nicht-zentrifugierten Urinprobe Nachweis von Mikroorganismen
--	-------------	--

bei einem Patient ≤ 1 Jahr Lebensalter:

mit oder ohne transurethralem Harnwegkatheter

und mindestens einem klinischen Symptom

mindestens eines der folgenden Anzeichen ohne andere erkennbare Ursache:

- Fieber (> 38 °C, rektal)
- Hypothermie (< 36 °C, rektal)
- Apnoe
- Bradykardie
- Dysurie
- Lethargie oder Erbrechen



D1
Symptomatische Harnwegsinfektion bei Patienten ≤ 1 Jahr Lebensalter