

postoperative Wundinfektion

Infektion nach einer OP (entsprechend der unten aufgeführten Kriterien)		
an der Inzisionsstelle, die nur Haut oder subkutanes Gewebe mit einbezieht <input type="checkbox"/>	an der Inzisionsstelle, die Faszienschicht und Muskelgewebe mit einbezieht <input type="checkbox"/>	die Organe oder Körperhöhlen erfasst, die während der Operation geöffnet wurden oder an denen manipuliert wurde <input type="checkbox"/>
und		
erste Symptome der Infektion innerhalb von 30 Tagen nach OP <input type="checkbox"/>	erste Symptome der Infektion innerhalb von 30 Tagen bzw. 90 Tagen nach OP in Abhängigkeit von der OP-Art <input type="checkbox"/>	
und mind. ein Kriterium		
<ul style="list-style-type: none"> • Eitrige Sekretion aus der oberflächlichen Inzision <input type="checkbox"/> • Erregernachweis aus aseptisch entnommenem Material von Inzision/ subkutanem Gewebe <input type="checkbox"/> • Eines der folgenden (es darf jedoch keine negative mikrobiol. Untersuchung vorliegen): <ul style="list-style-type: none"> – Schmerz/ Berührungsempfindlichkeit – lokalisierte Schwellung – Rötung/ Überwärmung und <ul style="list-style-type: none"> – bewusste Eröffnung der Inzision <input type="checkbox"/> • Diagnose Wundinfektion durch behandelnden Arzt <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • Eitrige Sekretion aus der Tiefe <input type="checkbox"/> • Alle 3 folgenden: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ein Anzeichen: Fieber (>38°C) oder Schmerz oder Berührungsempfindlichkeit und <ul style="list-style-type: none"> 2. spontane Dehiszenz/ bewusste Eröffnung und <ul style="list-style-type: none"> 3. Erregernachweis <input type="checkbox"/> • Abszess oder sonstige Infektionszeichen (festgestellt bei z.B. OP, Untersuchung, Bildgebung) <input type="checkbox"/> • Diagnose Wundinfektion durch behandelnden Arzt <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • Eitrige Sekretion aus Drainage mit Zugang zum OP-Gebiet <input type="checkbox"/> • Erregernachweis aus aseptisch entnommenem Material <input type="checkbox"/> • Abszess oder sonstige Infektionszeichen (festgestellt bei z.B. OP, Untersuchung, Bildgebung) <input type="checkbox"/> • Diagnose Wundinfektion durch behandelnden Arzt <input type="checkbox"/>
A1	A2	A3
oberflächliche postop. Wundinfektion	tiefe postop. Wundinfektion	postop. Körperhöhlen-/Organinfektion

Achtung!

Dieses Flowchart ist eine vereinfachte Darstellung. Es sind zusätzlich immer auch die detaillierteren Angaben in den KISS-Definitionen zu beachten