

Kürzel: **PARO** Name der Indikator-OP-Art: **Parotidektomie**



### **Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2015)**

5-262.0	Parotidektomie, partiell
5-262.1	Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis
5-262.2	Parotidektomie, komplett mit Resektion des N. facialis
5-262.3	Parotidektomie, komplett mit Resektion und Rekonstruktion des N. facialis

### **Notwendige Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):**

- Geburtsjahrgang und Geschlecht, OP-Datum, Surveillanceende (optional)
- Präoperativer ASA-Score des Patienten
- Schnitt-Naht-Zeit in Minuten
- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen der CDC

#### Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:

1 (aseptisch) → wegen Eröffnung des Speicheldrüsenausführungsganges nicht möglich

2 (bedingt aseptisch) → Normalfall (z.B. bei Speichelstein oder Tumor), sofern die Parotis nicht entzündet ist

3 (kontaminiert)

- frische offene Verletzung

4 (septisch-infiziert)

- akute eitrige Entzündung im OP-Gebiet

### **Erfassung von Infektionen:**

#### **A1 Postoperative oberflächliche Wundinfektion**

- Infektion der oberflächlichen Hautinzision

#### **A2 Postoperative tiefe Wundinfektion**

- Infektion der tiefen Inzision

#### **A3 Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet**

- Infektion von Organen in der Parotisgegend, z.B. Restparotis