

Kürzel:

PARO

Name der Indikator-OP-Art:

Parotidektomie



Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2016)

5-262.0	Parotidektomie, partiell
5-262.1	Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis
5-262.2	Parotidektomie, komplett mit Resektion des N. facialis
5-262.3	Parotidektomie, komplett mit Resektion und Rekonstruktion des N. facialis

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen der CDC
Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:
 - 1 (aseptisch) → wegen Eröffnung des Speicheldrüsenausführungsganges nicht möglich
 - 2 (bedingt aseptisch) → Normalfall (z.B. bei Speichelstein oder Tumor), sofern die Parotis nicht entzündet ist
 - 3 (kontaminiert)
 - frische offene Verletzung
 - 4 (septisch-infiziert)
 - akute eitrige Entzündung im OP-Gebiet
- weitere Parameter siehe OP-KISS Protokoll

Erfassung von Infektionen:

A1 Postoperative oberflächliche Wundinfektion

- Infektion der oberflächlichen Hautinzision

A2 Postoperative tiefe Wundinfektion

- Infektion der tiefen Inzision

A3 Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet

- Infektion von Organen in der Parotisgegend, z.B. Restparotis