
Anlage zum OP-KISS-Protokoll: Beschreibung der Indikator-OP-Arten



Nationales Referenzzentrum für Surveillance

von nosokomialen Infektionen



Kürzel:

Beschreibung: Lobektomie oder Bilobektomie.

Name der Indikator-OP-Art:

Die Auswertung erfolgt getrennt für thorakoskopische und offen

chirurgische Eingriffe. Es wird für jeden Eingriff "endoskopisch: Ja/Nein"

erfasst.

Einzuschließende Prozeduren: OPS-Codes (Version 2018)

Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge

Inkl.: Viszerale Pleurektomie

The Tiozoraio Frodronto
Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch
Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
Mit bronchoplastischer Erweiterung
Mit angioplastischer Erweiterung
Sonstige

5-324.3	Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch
5-324.31	Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
5-324.32	Mit bronchoplastischer Erweiterung
5-324.33	Mit angioplastischer Erweiterung
5-324.34	Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung
5-324.3x	Sonstige
5-324.6	Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch
5-324.61	Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
5-324.62	Mit bronchoplastischer Erweiterung
5-324.6x	Sonstige
5-324.7	Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch
5-324.71	Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
5-324.7x	Sonstige
5-324.8	Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch
5-324.81	Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
5-324.8x	Sonstige
5-324.9	Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch

0 0 <u>L</u> 1.7 X	Conoligo
5-324.8	Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch
5-324.81	Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
5-324.8x	Sonstige
5-324.9	Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch
5-324.91	Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
5-324.9x	Sonstige
5-324.a	Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch
5-324.a1	Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
5-324.a2	Mit bronchoplastischer Erweiterung
5-324.a3	Mit angioplastischer Erweiterung
5-324.a4	Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung
5-324.a5	Mit Bifurkationsresektion
5-324.ax	Sonstige
5-324.b	Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch
5-324.b1	Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
5-324.b2	Mit bronchoplastischer Erweiterung
5-324.b3	Mit angioplastischer Erweiterung
5-324.b4	Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung
5-324.b5	Mit Bifurkationsresektion
5-324.bx	Sonstige

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste ("Nennerdaten"):

- vollständig endoskopischer Eingriff: Ja/Nein
- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen der CDC Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:
 - 1 (aseptisch) \rightarrow wegen Eröffnung des Respirationstraktes nicht möglich
 - 2 (bedingt aseptisch)
 - Normalfall
 - 3 (kontaminiert)
 - außergewöhnliche intraoperative Kontamination (z.B. Verletzung des Ösophagus)
 - Dekortikation der Restlunge (d.h. Entfernung der Pleura viszeralis bei entzündlicher Schwartenbildung)
 - 4 (septisch-infiziert)
 - Pleuraempyem
 - Pneumonisch-abszedierende Lunge bricht intraoperativ auf (z.B. bei nektrotisch zerfallenden Tumoren, poststenotisch abszedierender Pneumonie bei stenosierendem Tumor)

Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage

Erfassung der Infektionen:

Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen (ehemals CDC-Definitionen):

A1 (oberflächliche post-op. WI):

- nur oberflächliche Infektion ohne Hinweise auf Beteiligung der Thoraxwand
- A2 (tiefe post-op. WI):
- Infektion der Thoraxwand
- A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):
- Empyem (intrathorakal)