

gültig ab: 01.01.2021

Kürzel:

SECC

Name der Indikator-OP-Art:

Sectio Caesarea

Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2021)

- 5-740 Klassische Sectio caesarea**
- 5-741 Sectio caesarea, suprazervikal und korporal**
- 5-742 Sectio caesarea extraperitonealis**
- 5-749 Andere Sectio caesarea**
 - 5-749.0 Resectio**
 - 5-749.1 Misgav-Ladach-Sectio**

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls
Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:
 - 1 (aseptisch) → wegen Eröffnung des Urogenitaltraktes nicht möglich
 - 2 (bedingt aseptisch)
 - Normalfall – Fruchtblase nicht eröffnet, keine mütterlichen Infektionszeichen
 - 3 (kontaminiert)
 - offene Fruchtblase, keine mütterlichen Infektionszeichen
 - 4 (septisch)
 - Mütterliche Infektionszeichen (z.B. Fieber, Leukozytose, CRP-Erhöhung, trübes oder übelriechendes Fruchtwasser)

Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage

Erfassung der Infektionen:

Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen:

- A1 (oberflächliche post-op. WI):
 - Erfasst nur Haut und/oder subcutanes Fettgewebe
- A2 (tiefe post-op. WI):
 - Erfasst Faszien- und/oder Muskelgewebe
 - Exklusive Endometritis
- A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):
 - Inklusive Endometritis und/oder Peritonitis