

gültig ab: 01.01.2022

Kürzel:

GC_ABD

Name der Indikator-OP-Art:

Eingr. an Aorta abdominalis / Aa. iliaca

- exklusive von Bypässen/Prothesen, welche die Leiste überbrücken (→ GC_EXT)
- **exklusive perkutan-transluminale Eingriffe**
- **für den Einschluss einer OP in KISS muss mindestens eine Inzision durch die Haut erfolgen**

Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2022)

5-380.33	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta abdominalis
5-380.51-55, 5x	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin
5-381.33	Enderarteriektomie: Aorta abdominalis
5-381. 51-55, 5x	Enderarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin
5-382.33	Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta abdominalis
5-382.5	Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin
5-383.5	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin
5-384.51	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis: Mit Rohrprothese
5-384.52	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis: Mit Rohrprothese bei Aneurysma
5-384.53	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis: Mit Bifurkationsprothese biliakal
5-384.54	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma
5-384.61	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Rohrprothese
5-384.62	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma
5-384.63	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprot. biliakal Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprot. Biliakal bei Aneurysma
5-384.64	Resektion + Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese
5-384.72	Resektion + Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprot. bei Aneurysma
5-384.73	Resektion + Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprot. biliakal
5-384.74	Resektion + Ersatz (Interposition) an der Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprot. biliakal b. Aneurysma
5-384.x1	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Rohrprothese
5-384.x2	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Rohrprothese bei Aneurysma
5-384.x3	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese biliakal
5-384.x4	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese biliakal bei Aneurysma
5-386.33	Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Aorta abdominalis
5-386.5	Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien abdominal und pelvin
5-388.33	Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis
5-388.5	Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin
5-393.32	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortoortal
5-393.33	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortoliakal
5-393.41	Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Ilioliakal
5-395.33	Patchplastik an Blutgefäßen: Aorta abdominalis
5-395.52-55,5x	Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin
5-396.5	Transposition von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin
5-397.33	Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Aorta abdominalis
5-397.5	Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin

Kurzfassung:

5-380.33, 5-380.51-55, 5x; 5-381.33, 5-381.51-55, 5x; 5-384.51-54; 5-384.61-64; 5-384.71-74; 5-384.x1-x4; 5-393.32-33, 5-393.41, 5-395.33, 5-395.52-55,5x
sowie folgende Viersteller, sofern in der fünften/sechsten Stelle als Lokalisationsangabe 33 oder 5_ folgt: 5-382, 5-383, 5-386, 5-388, 5-396, 5-397

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

- Verwendung eines Implantats nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls: Ja/Nein/Unbekannt
- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls

Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:

(gilt für GC CAR, GC ABD, GC EXT)

1 (aseptisch) → Normalfall

2 (bedingt aseptisch) → nicht möglich

3 (kontaminiert) → nur ausnahmsweise, wie z.B. bei akzidenteller Eröffnung des Respirations/Gastrointestinal/Urogenital-Traktes

4 (septisch-infiziert) → Infektion / Ulcus im Bereich der Inzision

Die Angabe der Wundkontaminationsklasse bezieht sich *per definitionem* auf das OP-Gebiet.

Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 90 Tage

Erfassung der Infektionen:

Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen:

(gilt für GC CAR, GC ABD, GC EXT)

A1 (oberflächliche post-op. WI):

- Infektionen von Haut und/oder subkutanem Fettgewebe

A2 (tiefe post-op. WI):

- Infektionen von Faszien- und/oder Muskelgewebe

A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):

- mit Beteiligung von Gefäßprothesen / Bypass- / Patchmaterial
- Körperhöhlen-Infektion, z.B. retroperitoneale Infektion / Peritonitis