



Kürzel: **HYST** Name der Indikator-OP-Art: **Hysterektomie**

Kürzel: HYST\_A: Abdominelle Hysterektomie (mit oder ohne Adnektomie)  
bei laparoskopischem oder offen chirurgischem Zugang  
HYST\_V: Hysterektomie mit vaginalem Zugang

### Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2022)

#### HYST\_A:

##### Subtotale Uterusexstirpation

*Hinw.:* Der Zugang ist in der 6. Stelle kodiert:

- 5-682.\_0 Offen chirurgisch (abdominal)
- 5-682.21 Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis) (laparoskopisch) *(bei Eingabe in webKess: endoskopisch JA)*
- 5-682.\_2 Endoskopisch (laparoskopisch) *(bei Eingabe in webKess: endoskopisch JA)*  
**Ausnahme: 5-582.22 – Umsteigen endoskopische – offen chirurgische Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis) (bei Eingabe in webKess: endoskopisch NEIN)**
- 5-682.\_3 Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch
- 5-682.\_4 Umsteigen vaginal – offen chirurgisch

##### Uterusexstirpation [Hysterektomie]

- 5-683.\_0 Offen chirurgisch (abdominal)
- 5-683.\_3 Endoskopisch (laparoskopisch) *(bei Eingabe in webKess: endoskopisch JA)*
- 5-683.\_4 Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch
- 5-683.\_5 Umsteigen vaginal – offen chirurgisch

Exkl. 5-683.4\_ Zur Transplantation, Lebendspenderin

##### Radikale Uterusexstirpation [Hysterektomie]

- 5-685.00 Offen chirurgisch (abdominal)
- 5-685.03 umsteigen vaginal – offen chirurgisch
- 5-685.1 Radikale Uterusexstirpation mit pelviner Lymphadenektomie
- 5-685.2 Radikale Uterusexstirpation mit paraaortaler Lymphadenektomie
- 5-685.3 Radikale Uterusexstirpation mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie
- 5-685.4 Totale mesometriale Resektion des Uterus (TMMR)

#### HYST\_V: (es kann hier nur die tiefe Infektion (A3) erfasst werden)

##### Subtotale Uterusexstirpation

*Hinw.:* Der Zugang ist in der 6. Stelle kodiert:

- 5-682.\_5 vaginal

##### Uterusexstirpation [Hysterektomie]

- 5-683.\_1 vaginal
- 5-683.\_2 vaginal, laparoskopisch assistiert

##### Radikale Uterusexstirpation [Hysterektomie] ohne Lymphadenektomie

- 5-685.01 vaginal
- 5-685.02 vaginal, laparoskopisch assistiert

## Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage

### Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse (für HYST A und HYST V):

- 1 (aseptisch) → Wegen Eröffnung des Urogenitaltraktes nicht möglich
- 2 (bedingt aseptisch) → Normalfall
- 3 (kontaminiert) → (ausnahmsweise z.B. bei akzidentieller Eröffnung des Darmes)
- 4 (septisch-infiziert) → bereits präoperativ bestehende Infektion im OP-Gebiet