

Kürzel:

**PARO**

Name der Indikator-OP-Art:

**Parotidektomie**



## **Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2022)**

5-262.0	Parotidektomie, partiell
5-262.1	Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis
5-262.2	Parotidektomie, komplett mit Resektion des N. facialis
5-262.3	Parotidektomie, komplett mit Resektion und Rekonstruktion des N. facialis

## **Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):**

- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls  
Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:
  - 1 (aseptisch) → wegen Eröffnung des Speicheldrüsenausführungsganges nicht möglich
  - 2 (bedingt aseptisch) → Normalfall (z.B. bei Speichelstein oder Tumor), sofern die Parotis nicht entzündet ist
  - 3 (kontaminiert)
    - frische offene Verletzung
  - 4 (septisch-infiziert)
    - akute eitrige Entzündung im OP-Gebiet
- weitere Parameter siehe OP-KISS Protokoll

## **Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage**

### **Erfassung von Infektionen:**

#### **A1 Postoperative oberflächliche Wundinfektion**

- Infektion der oberflächlichen Hautinzision

#### **A2 Postoperative tiefe Wundinfektion**

- Infektion der tiefen Inzision

#### **A3 Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet**

- Infektion von Organen in der Parotisgegend, z.B. Restparotis