

Kürzel:

**SECC**

Name der Indikator-OP-Art:

**Sectio Caesarea**



## Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2022)

- 5-740 Klassische Sectio caesarea
- 5-741 Sectio caesarea, suprazervikal und korporal
- 5-742 Sectio caesarea extraperitonealis
- 5-749 Andere Sectio caesarea
  - 5-749.0 Resectio
  - 5-749.1 Misgav-Ladach-Sectio

## Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls  
Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:
  - 1 (aseptisch) → wegen Eröffnung des Urogenitaltraktes nicht möglich
  - 2 (bedingt aseptisch)
    - Normalfall – Fruchtblase nicht eröffnet, keine mütterlichen Infektionszeichen
  - 3 (kontaminiert)
    - offene Fruchtblase, keine mütterlichen Infektionszeichen
  - 4 (septisch)
    - Mütterliche Infektionszeichen (z.B. Fieber, Leukozytose, CRP-Erhöhung, trübes oder übelriechendes Fruchtwasser)

## Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage

### Erfassung der Infektionen:

#### Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen:

- A1 (oberflächliche post-op. WI):
  - Erfasst nur Haut und/oder subcutanes Fettgewebe
- A2 (tiefe post-op. WI):
  - Erfasst Faszien- und/oder Muskelgewebe
  - Exklusive Endometritis
- A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):
  - Inklusive Endometritis und/oder Peritonitis