

Einzuschließende Prozeduren : OPS-Codes (Version 2026)

5-403 Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]

5-403.0 Selektiv (funktionell)

- .00 ↔ 1 Region
- .01 ↔ 2 Regionen
- .02 ↔ 3 Regionen
- .03 ↔ 4 Regionen
- .04 ↔ 5 Regionen
- .05 ↔ 6 Regionen

5-403.1 Radikal

- .10 ↔ 4 Regionen
- .11 ↔ 5 Regionen
- .12 ↔ 6 Regionen

5-403.2 Radikal, modifiziert

- .20 ↔ 4 Regionen
- .21 ↔ 5 Regionen
- .22 ↔ 6 Regionen

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse):

- 1 (aseptisch) → wenn keine Pharynxeröffnung erfolgt
- 2 (bedingt aseptisch) → Neck dissection mit Eröffnung des Pharynx/Luftwege
- 3 (kontaminiert) → (ausnahmsweise z.B. intraoperative Kontamination)
- 4 (septisch-infiziert) → bereits präoperativ bestehende Infektion im OP-Gebiet

Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage