

Kürzel:

PRST

Name der Indikator-OP-Art:

Prostatektomie

Beschreibung:

Radikale Prostatektomie, einschließlich laparoskopischer Eingriffe. **Die Auswertung erfolgt getrennt.** Es wird für jeden Eingriff „endoskopisch: Ja/Nein“ erfasst.
NICHT mit eingeschlossen sind OP mit transrektalem oder transurethralem Zugangsweg.

Einzuschließende Prozeduren: OPS-Codes (Version 2026)

5-604

Radikale Prostatovesikulektomie

inclusive: 5-604.4 Laparoskopisch

5-604.5 Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend

(=> bei der Erfassung in webKess: endoskopisch Ja angeben)

Hinweise zu notwendigen Daten für die OP-Liste („Nennerdaten“):

- Wundkontaminationsklasse, nach den Festlegungen des OP-KISS Protokolls
Beispiele zur Anwendung der Wundkontaminationsklasse:
 - 1 (aseptisch) → wegen Eröffnung des Urogenitaltraktes **nicht** möglich
 - 2 (bedingt aseptisch)
 - Normalfall
 - 3 (kontaminiert)
 - Eingriffe bei Prostatitis
 - akzidentielle Eröffnung des Gastrointestinaltraktes
 - 4 (septisch-infiziert)
 - infizierte Tumore
 - eitrige Entzündungen

Surveillancezeit für diese Indikatoroperation: 30 Tage

Erfassung der Infektionen:

Beispiele zur Anwendung der KISS-Definitionen:

A1 (oberflächliche post-op. WI):

- Infektionen von Haut und subcutanem Fettgewebe

A2 (tiefe post-op. WI):

- Infektionen der (Skelett)muskelschicht

A3 (Organ/Körperhöhlen-Infektion):

- Infektionen des Bauchraums
- Infektionen der Prostataloge
- Infektionen im kleinen Becken

Anmerkungen:

Nachweise von klinisch relevanten Erregern aus Hämatomen oder Lymphozelen im OP-Gebiet sind unter Anwendung der KISS-Kriterien als Wundinfektionen zu werten.