

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System



Nationales Referenzzentrum
für Surveillance von
nosokomialen Infektionen

Modul OP-KISS Referenzdaten

**Berechnungszeitraum: Januar 2020 bis Dezember 2024
Erstellungsdatum: 16.April 2025**

Nationales Referenzzentrum
für Surveillance
von nosokomialen Infektionen
Hindenburgdamm 27
12203 Berlin
Tel.: 030 / 450-577-612
Fax: 030 / 450-577-920
www.nrz-hygiene.de
Version: 16.April 2025

Referenzdaten

Operationsart: APPE, Appendektomie (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	44	2029	6	0,30	0,00	0,00	0,00
1	48	5291	55	1,04	0,00	0,00	1,71
2, 3	47	2275	35	1,54	0,00	0,00	2,54
0, 1, 2, 3	48	9595	96	1,00	0,00	0,42	1,79

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	48	9595	39	0,41	0,00	0,00	0,50
A2	48	9595	9	0,09	0,00	0,00	0,00
A3	48	9595	48	0,50	0,00	0,00	0,84

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	44	2029	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	48	5291	16	0,30	0,00	0,00	0,00
2, 3	47	2275	12	0,53	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	48	9595	28	0,29	0,00	0,00	0,24

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	48	9595	5	0,05	0,00	0,00	0,00
A2	48	9595	2	0,02	0,00	0,00	0,00
A3	48	9595	21	0,22	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 57, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: APPE, Appendektomie (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	14	59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33	139	9	6,47	0,00	0,00	0,00
2, 3	36	130	13	10,00	0,00	0,00	15,00
0, 1, 2, 3	44	328	22	6,71	0,00	0,00	11,81

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	44	328	12	3,66	0,00	0,00	2,17
A2	44	328	4	1,22	0,00	0,00	0,00
A3	44	328	6	1,83	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	14	59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33	139	8	5,76	0,00	0,00	0,00
2, 3	36	130	11	8,46	0,00	0,00	9,17
0, 1, 2, 3	44	328	19	5,79	0,00	0,00	6,70

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	44	328	12	3,66	0,00	0,00	2,17
A2	44	328	3	0,91	0,00	0,00	0,00
A3	44	328	4	1,22	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 97, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: APPE_Ki, Appendektomie - Kinderchirurgie (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	22	1157	6	0,52	0,00	0,00	0,00
1	26	2000	32	1,60	0,00	0,00	0,96
2, 3	21	684	16	2,34	0,00	0,00	0,96
0, 1, 2, 3	26	3841	54	1,41	0,00	0,00	1,16

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	26	3841	32	0,83	0,00	0,00	0,23
A2	26	3841	7	0,18	0,00	0,00	0,00
A3	26	3841	15	0,39	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	22	1157	1	0,09	0,00	0,00	0,00
1	26	2000	9	0,45	0,00	0,00	0,00
2, 3	21	684	9	1,32	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	26	3841	19	0,49	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	26	3841	10	0,26	0,00	0,00	0,00
A2	26	3841	2	0,05	0,00	0,00	0,00
A3	26	3841	7	0,18	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 73, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: APPE_Ki, Appendektomie - Kinderchirurgie (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	10	79	1	1,27	0,00	0,00	0,00
1	18	497	15	3,02	0,00	0,00	0,00
2, 3	10	169	15	8,88	0,00	0,00	5,00
0, 1, 2, 3	18	745	31	4,16	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	18	745	25	3,36	0,00	0,00	0,00
A2	18	745	1	0,13	0,00	0,00	0,00
A3	18	745	5	0,67	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	10	79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	18	497	8	1,61	0,00	0,00	0,00
2, 3	10	169	9	5,33	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	18	745	17	2,28	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	18	745	14	1,88	0,00	0,00	0,00
A2	18	745	1	0,13	0,00	0,00	0,00
A3	18	745	2	0,27	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 97, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: ART, Arthroskopische Eingriffe am Kniegelenk

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	36	9590	18	0,19	0,00	0,00	0,11
1, 2, 3	36	5340	14	0,26	0,00	0,00	0,25
0, 1, 2, 3	36	14930	32	0,21	0,00	0,00	0,21

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	36	14930	4	0,03	0,00	0,00	0,00
A2, A3	36	14930	28	0,19	0,00	0,00	0,21

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	36	9590	1	0,01	0,00	0,00	0,00
1, 2, 3	36	5340	3	0,06	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	36	14930	4	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	36	14930	1	0,01	0,00	0,00	0,00
A2, A3	36	14930	3	0,02	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 65, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: CARD, Operationen am Herzen (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	7	33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2195	20	0,91	0,00	0,00	0,40
2, 3	10	717	7	0,98	0,00	0,00	2,11
0, 1, 2, 3	10	2945	27	0,92	0,00	0,17	1,39

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	10	2945	19	0,65	0,00	0,00	0,69
A2	10	2945	7	0,24	0,00	0,00	0,69
A3	10	2945	1	0,03	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	7	33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2195	9	0,41	0,00	0,00	0,00
2, 3	10	717	5	0,70	0,00	0,00	1,89
0, 1, 2, 3	10	2945	14	0,48	0,00	0,09	0,72

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	10	2945	10	0,34	0,00	0,00	0,45
A2	10	2945	3	0,10	0,00	0,00	0,06
A3	10	2945	1	0,03	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 182, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: CARD, Operationen am Herzen (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	10	94	1	1,06	0,00	0,00	0,00
1	15	4919	57	1,16	0,46	1,01	2,78
2, 3	15	2129	28	1,32	0,00	1,47	2,00
0, 1, 2, 3	15	7142	86	1,20	0,63	1,27	2,07

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	15	7142	23	0,32	0,00	0,31	0,50
A2	15	7142	44	0,62	0,16	0,48	1,01
A3	15	7142	19	0,27	0,00	0,16	0,39

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	10	94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15	4919	23	0,47	0,00	0,36	0,87
2, 3	15	2129	13	0,61	0,00	0,49	1,33
0, 1, 2, 3	15	7142	36	0,50	0,16	0,41	0,70

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	15	7142	11	0,15	0,00	0,00	0,24
A2	15	7142	16	0,22	0,00	0,19	0,41
A3	15	7142	9	0,13	0,00	0,00	0,25

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 255, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: CHOL, Cholezystektomie (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	213	46606	334	0,72	0,00	0,40	1,11
1	218	35726	324	0,91	0,00	0,49	1,56
2, 3	209	21219	316	1,49	0,00	0,66	2,50
0, 1, 2, 3	218	103551	974	0,94	0,19	0,77	1,54

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	218	103551	540	0,52	0,00	0,30	0,84
A2	218	103551	121	0,12	0,00	0,00	0,16
A3	218	103551	313	0,30	0,00	0,00	0,40

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	213	46606	56	0,12	0,00	0,00	0,00
1	218	35726	92	0,26	0,00	0,00	0,32
2, 3	209	21219	151	0,71	0,00	0,00	0,86
0, 1, 2, 3	218	103551	299	0,29	0,00	0,13	0,41

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	218	103551	104	0,10	0,00	0,00	0,13
A2	218	103551	31	0,03	0,00	0,00	0,00
A3	218	103551	164	0,16	0,00	0,00	0,18

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 78, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: CHOL, Cholezystektomie (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	166	1025	24	2,34	0,00	0,00	0,00
1	186	1693	62	3,66	0,00	0,00	0,00
2, 3	169	2321	138	5,95	0,00	0,00	7,69
0, 1, 2, 3	201	5039	224	4,45	0,00	0,00	6,67

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	201	5039	123	2,44	0,00	0,00	3,13
A2	201	5039	47	0,93	0,00	0,00	0,00
A3	201	5039	54	1,07	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	166	1025	14	1,37	0,00	0,00	0,00
1	186	1693	37	2,19	0,00	0,00	0,00
2, 3	169	2321	97	4,18	0,00	0,00	5,00
0, 1, 2, 3	201	5039	148	2,94	0,00	0,00	4,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	201	5039	77	1,53	0,00	0,00	0,00
A2	201	5039	31	0,62	0,00	0,00	0,00
A3	201	5039	40	0,79	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 135, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: COBY_L, Coronare Bypass-Operation mit Entnahme von autologen Gefäßen an den Extremitäten
(EXTREMITÄTENWUNDE)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0, 1	35	24713	110	0,45	0,00	0,20	0,80
2, 3	34	7887	61	0,77	0,00	0,24	1,26
0, 1, 2, 3	35	32600	171	0,52	0,00	0,25	0,90

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	35	32600	83	0,25	0,00	0,08	0,41
A2	35	32600	88	0,27	0,00	0,12	0,42

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0, 1	35	24713	39	0,16	0,00	0,00	0,20
2, 3	34	7887	28	0,36	0,00	0,00	0,53
0, 1, 2, 3	35	32600	67	0,21	0,00	0,09	0,33

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	35	32600	40	0,12	0,00	0,00	0,17
A2	35	32600	27	0,08	0,00	0,00	0,13

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 254, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: COBY_L, Coronare Bypass-Operation mit Entnahme von autologen Gefäßen an den Extremitäten (THORAXWUNDE)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0, 1	35	24713	544	2,20	1,21	1,90	2,96
2, 3	34	7887	218	2,76	1,10	2,94	4,29
0, 1, 2, 3	35	32600	762	2,34	1,30	2,11	3,38

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	35	32600	254	0,78	0,31	0,66	1,11
A2	35	32600	366	1,12	0,50	1,11	1,61
A3	35	32600	142	0,44	0,00	0,17	0,70

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0, 1	35	24713	228	0,92	0,29	0,81	1,20
2, 3	34	7887	89	1,13	0,00	0,84	1,58
0, 1, 2, 3	35	32600	317	0,97	0,37	0,81	1,26

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	35	32600	129	0,40	0,00	0,27	0,60
A2	35	32600	117	0,36	0,04	0,30	0,51
A3	35	32600	71	0,22	0,00	0,05	0,43

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 254, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: COBY_T, Coronare Bypass-Operation ohne Entnahme von autologen Gefäßen an den Extremitäten

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0, 1	33	7067	205	2,90	0,65	1,86	4,58
2, 3	31	2247	77	3,43	0,00	1,96	5,26
0, 1, 2, 3	33	9314	282	3,03	0,80	2,33	3,66

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	33	9314	79	0,85	0,00	0,53	1,50
A2	33	9314	178	1,91	0,00	0,80	1,89
A3	33	9314	25	0,27	0,00	0,00	0,22

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0, 1	33	7067	55	0,78	0,00	0,53	1,22
2, 3	31	2247	27	1,20	0,00	0,00	1,00
0, 1, 2, 3	33	9314	82	0,88	0,00	0,58	1,22

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	33	9314	33	0,35	0,00	0,00	0,47
A2	33	9314	43	0,46	0,00	0,00	0,34
A3	33	9314	6	0,06	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 252, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: COLO, Eingriffe am Kolon (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	184	7063	243	3,44	0,00	1,13	5,83
1	189	11731	532	4,53	0,00	3,36	7,19
2	182	5324	303	5,69	0,00	3,51	8,57
3	128	762	58	7,61	0,00	0,00	7,69
0, 1, 2, 3	190	24880	1136	4,57	1,90	3,72	7,02

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	190	24880	408	1,64	0,00	1,05	2,46
A2	190	24880	158	0,64	0,00	0,00	0,74
A3	190	24880	570	2,29	0,00	1,72	3,80

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	184	7063	168	2,38	0,00	0,00	3,88
1	189	11731	400	3,41	0,00	2,27	5,26
2	182	5324	244	4,58	0,00	1,80	7,35
3	128	762	49	6,43	0,00	0,00	3,54
0, 1, 2, 3	190	24880	861	3,46	1,00	2,67	5,29

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	190	24880	259	1,04	0,00	0,34	1,63
A2	190	24880	118	0,47	0,00	0,00	0,54
A3	190	24880	484	1,95	0,00	1,28	2,94

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 192, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: COLO, Eingriffe am Kolon (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	188	5012	291	5,81	0,00	3,47	8,63
1	193	13575	1136	8,37	3,45	7,04	11,34
2	194	10724	1025	9,56	3,39	8,17	13,04
3	160	2043	244	11,94	0,00	6,25	16,67
0, 1, 2, 3	194	31354	2696	8,60	4,00	7,80	11,28

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	194	31354	1166	3,72	1,08	2,81	5,15
A2	194	31354	439	1,40	0,00	0,95	2,00
A3	194	31354	1091	3,48	0,79	2,94	5,30

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	188	5012	231	4,61	0,00	2,02	7,69
1	193	13575	977	7,20	2,38	5,88	10,00
2	194	10724	940	8,77	2,70	7,67	11,63
3	160	2043	228	11,16	0,00	4,88	16,67
0, 1, 2, 3	194	31354	2376	7,58	3,33	6,72	10,34

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	194	31354	992	3,16	0,58	2,20	4,39
A2	194	31354	384	1,22	0,00	0,74	1,82
A3	194	31354	1000	3,19	0,71	2,63	4,76

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 181, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: COLO, Eingriffe am Kolon (elektiv)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	186	10331	447	4,33	0,00	3,42	7,14
1	190	18870	1176	6,23	2,56	5,59	9,04
2	186	8973	708	7,89	1,18	6,82	11,32
3	147	1379	133	9,64	0,00	0,00	16,67
0, 1, 2, 3	191	39553	2464	6,23	3,37	5,96	9,05

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	191	39553	969	2,45	0,59	1,79	3,71
A2	191	39553	365	0,92	0,00	0,69	1,50
A3	191	39553	1130	2,86	0,69	2,24	4,55

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	186	10331	329	3,18	0,00	2,40	5,62
1	190	18870	959	5,08	1,65	4,19	7,50
2	186	8973	611	6,81	0,00	5,52	10,20
3	147	1379	122	8,85	0,00	0,00	14,71
0, 1, 2, 3	191	39553	2021	5,11	2,38	4,76	7,69

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	191	39553	730	1,85	0,00	1,34	2,70
A2	191	39553	296	0,75	0,00	0,45	1,20
A3	191	39553	995	2,52	0,30	1,89	4,18

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 190, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: COLO, Eingriffe am Kolon (Notfall)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	157	1068	53	4,96	0,00	0,00	4,55
1	182	4481	313	6,99	0,00	5,14	10,62
2	182	5471	462	8,44	0,00	5,63	11,63
3	155	1353	161	11,90	0,00	0,00	18,18
0, 1, 2, 3	188	12373	989	7,99	2,98	6,78	11,53

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	188	12373	448	3,62	0,00	2,22	5,00
A2	188	12373	179	1,45	0,00	0,00	1,98
A3	188	12373	362	2,93	0,00	1,76	5,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	157	1068	42	3,93	0,00	0,00	0,00
1	182	4481	265	5,91	0,00	3,92	9,09
2	182	5471	426	7,79	0,00	5,00	10,34
3	155	1353	152	11,23	0,00	0,00	15,00
0, 1, 2, 3	188	12373	885	7,15	1,94	6,03	10,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	188	12373	386	3,12	0,00	1,79	4,39
A2	188	12373	160	1,29	0,00	0,00	1,79
A3	188	12373	339	2,74	0,00	1,39	4,52

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 168, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: FPF_G, geschlossene Reposition bei Fraktur des proximalen Femurs

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	61	3263	20	0,61	0,00	0,00	0,00
1	61	9349	93	0,99	0,00	0,56	1,39
2, 3	60	2534	41	1,62	0,00	0,00	2,74
0, 1, 2, 3	61	15146	154	1,02	0,00	0,68	1,56

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	61	15146	48	0,32	0,00	0,00	0,48
A2	61	15146	65	0,43	0,00	0,00	0,56
A3	61	15146	41	0,27	0,00	0,00	0,22

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	61	3263	11	0,34	0,00	0,00	0,00
1	61	9349	51	0,55	0,00	0,00	0,71
2, 3	60	2534	27	1,07	0,00	0,00	1,57
0, 1, 2, 3	61	15146	89	0,59	0,00	0,35	0,80

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	61	15146	36	0,24	0,00	0,00	0,23
A2	61	15146	31	0,20	0,00	0,00	0,23
A3	61	15146	22	0,15	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 59, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: FPF_O, offene Reposition bei Fraktur des proximalen Femurs

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	49	983	11	1,12	0,00	0,00	0,00
1	53	2149	49	2,28	0,00	0,00	2,78
2, 3	49	630	29	4,60	0,00	0,00	6,67
0, 1, 2, 3	53	3762	89	2,37	0,00	0,94	3,45

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	53	3762	22	0,58	0,00	0,00	0,57
A2	53	3762	38	1,01	0,00	0,00	1,27
A3	53	3762	29	0,77	0,00	0,00	0,57

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	49	983	5	0,51	0,00	0,00	0,00
1	53	2149	34	1,58	0,00	0,00	1,67
2, 3	49	630	24	3,81	0,00	0,00	5,26
0, 1, 2, 3	53	3762	63	1,67	0,00	0,00	2,30

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	53	3762	16	0,43	0,00	0,00	0,00
A2	53	3762	32	0,85	0,00	0,00	0,94
A3	53	3762	15	0,40	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 120, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: GC_ABD, Eingriffe an der Aorta abdominalis

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	12	124	3	2,42	0,00	0,00	0,00
1	12	674	31	4,60	0,00	3,10	5,51
2, 3	12	224	15	6,70	0,00	3,77	11,49
0, 1, 2, 3	12	1022	49	4,79	1,22	3,39	5,91

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	12	1022	8	0,78	0,00	0,00	1,16
A2, A3	12	1022	41	4,01	0,67	2,45	4,22

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	12	124	2	1,61	0,00	0,00	0,00
1	12	674	14	2,08	0,00	0,00	3,22
2, 3	12	224	10	4,46	0,00	0,00	6,60
0, 1, 2, 3	12	1022	26	2,54	0,00	2,00	4,24

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	12	1022	7	0,68	0,00	0,00	0,85
A2, A3	12	1022	19	1,86	0,00	1,40	2,57

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 209, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: GC_CAR, Carotis-Gabel-Rekonstruktion

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	32	1107	3	0,27	0,00	0,00	0,00
1	33	5444	23	0,42	0,00	0,00	0,67
2, 3	33	1697	9	0,53	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	33	8248	35	0,42	0,00	0,18	0,68

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	33	8248	19	0,23	0,00	0,00	0,36
A2, A3	33	8248	16	0,19	0,00	0,00	0,18

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	32	1107	1	0,09	0,00	0,00	0,00
1	33	5444	3	0,06	0,00	0,00	0,00
2, 3	33	1697	4	0,24	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	33	8248	8	0,10	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	33	8248	4	0,05	0,00	0,00	0,00
A2, A3	33	8248	4	0,05	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 115, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: GC_EXT, Arterielle Rekonstruktion - untere Extremitäten

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	69	3092	75	2,43	0,00	0,74	4,55
1	71	19172	808	4,21	1,96	3,80	6,06
2, 3	69	6685	356	5,33	1,18	4,17	8,27
0, 1, 2, 3	71	28949	1239	4,28	1,93	3,87	6,77

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	71	28949	596	2,06	0,66	1,54	3,83
A2	71	28949	428	1,48	0,20	0,95	2,10
A3	71	28949	215	0,74	0,00	0,42	1,02

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	69	3092	20	0,65	0,00	0,00	0,00
1	71	19172	271	1,41	0,39	1,02	2,09
2, 3	69	6685	158	2,36	0,00	1,66	3,01
0, 1, 2, 3	71	28949	449	1,55	0,51	1,22	2,39

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	71	28949	209	0,72	0,00	0,51	1,19
A2	71	28949	159	0,55	0,00	0,25	0,74
A3	71	28949	81	0,28	0,00	0,00	0,44

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 200, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: HALLUX, Korrektur einer Hallux valgus Deformität

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	10	2940	11	0,37	0,00	0,00	0,28
1, 2, 3	10	1285	10	0,78	0,00	0,00	0,58
0, 1, 2, 3	10	4225	21	0,50	0,00	0,00	0,42

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	10	4225	15	0,36	0,00	0,00	0,42
A2, A3	10	4225	6	0,14	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	10	2940	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1, 2, 3	10	1285	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	10	4225	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	10	4225	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A2, A3	10	4225	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 81, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: HERN, Leistenhernie (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	96	15682	34	0,22	0,00	0,00	0,00
1	96	8217	26	0,32	0,00	0,00	0,00
2, 3	81	1182	7	0,59	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	97	25081	67	0,27	0,00	0,00	0,18

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	97	25081	45	0,18	0,00	0,00	0,00
A2	97	25081	11	0,04	0,00	0,00	0,00
A3	97	25081	11	0,04	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	96	15682	1	0,01	0,00	0,00	0,00
1	96	8217	3	0,04	0,00	0,00	0,00
2, 3	81	1182	2	0,17	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	97	25081	6	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	97	25081	1	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	97	25081	1	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	97	25081	4	0,02	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 75, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: HERN, Leistenhernie (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	91	5435	24	0,44	0,00	0,00	0,00
1	92	4809	33	0,69	0,00	0,00	0,00
2, 3	85	1204	19	1,58	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	93	11448	76	0,66	0,00	0,00	0,50

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	93	11448	47	0,41	0,00	0,00	0,00
A2	93	11448	21	0,18	0,00	0,00	0,00
A3	93	11448	8	0,07	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	91	5435	2	0,04	0,00	0,00	0,00
1	92	4809	4	0,08	0,00	0,00	0,00
2, 3	85	1204	7	0,58	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	93	11448	13	0,11	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	93	11448	7	0,06	0,00	0,00	0,00
A2	93	11448	2	0,02	0,00	0,00	0,00
A3	93	11448	4	0,03	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 74, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: HPRO_A, Hüftendoprothese bei Arthrose

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	505	157216	944	0,60	0,00	0,28	1,02
1	514	114113	1295	1,13	0,00	0,84	1,87
2, 3	504	28110	611	2,17	0,00	0,51	3,16
0, 1, 2, 3	517	299439	2850	0,95	0,32	0,86	1,66

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	517	299439	516	0,17	0,00	0,00	0,28
A2	517	299439	539	0,18	0,00	0,00	0,31
A3	517	299439	1795	0,60	0,00	0,40	0,92

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	505	157216	119	0,08	0,00	0,00	0,00
1	514	114113	271	0,24	0,00	0,00	0,37
2, 3	504	28110	194	0,69	0,00	0,00	0,58
0, 1, 2, 3	517	299439	584	0,20	0,00	0,00	0,35

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	517	299439	111	0,04	0,00	0,00	0,00
A2	517	299439	120	0,04	0,00	0,00	0,00
A3	517	299439	353	0,12	0,00	0,00	0,18

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 81, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: HPRO_F, Hüftendoprothese bei Fraktur

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	384	16968	181	1,07	0,00	0,00	1,27
1	388	51627	1027	1,99	0,00	1,36	2,96
2, 3	375	14360	442	3,08	0,00	1,52	4,55
0, 1, 2, 3	398	82955	1650	1,99	0,47	1,50	2,67

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	398	82955	265	0,32	0,00	0,00	0,41
A2	398	82955	382	0,46	0,00	0,00	0,61
A3	398	82955	1003	1,21	0,00	0,60	1,78

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	384	16968	77	0,45	0,00	0,00	0,00
1	388	51627	473	0,92	0,00	0,23	1,19
2, 3	375	14360	217	1,51	0,00	0,00	1,82
0, 1, 2, 3	398	82955	767	0,92	0,00	0,50	1,27

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	398	82955	136	0,16	0,00	0,00	0,00
A2	398	82955	190	0,23	0,00	0,00	0,24
A3	398	82955	441	0,53	0,00	0,00	0,62

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 88, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: HPRO_R, Hüftendoprothese (Revisionseingriffe)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	88	1375	29	2,11	0,00	0,00	0,00
1	106	2572	80	3,11	0,00	0,00	4,00
2, 3	93	1200	62	5,17	0,00	0,00	4,55
0, 1, 2, 3	109	5147	171	3,32	0,00	0,74	5,26

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	109	5147	31	0,60	0,00	0,00	0,00
A2	109	5147	51	0,99	0,00	0,00	0,00
A3	109	5147	89	1,73	0,00	0,00	2,56

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	88	1375	16	1,16	0,00	0,00	0,00
1	106	2572	50	1,94	0,00	0,00	1,85
2, 3	93	1200	51	4,25	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	109	5147	117	2,27	0,00	0,00	3,39

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	109	5147	23	0,45	0,00	0,00	0,00
A2	109	5147	42	0,82	0,00	0,00	0,00
A3	109	5147	52	1,01	0,00	0,00	1,32

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 140, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: HYST_A, abdominelle Hysterektomie (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	60	9568	57	0,60	0,00	0,00	0,80
1	60	3988	29	0,73	0,00	0,00	0,93
2, 3	47	480	7	1,46	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	61	14036	93	0,66	0,00	0,32	1,06

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	61	14036	19	0,14	0,00	0,00	0,00
A2	61	14036	12	0,09	0,00	0,00	0,00
A3	61	14036	62	0,44	0,00	0,00	0,52

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	60	9568	6	0,06	0,00	0,00	0,00
1	60	3988	7	0,18	0,00	0,00	0,00
2, 3	47	480	2	0,42	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	61	14036	15	0,11	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	61	14036	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	61	14036	1	0,01	0,00	0,00	0,00
A3	61	14036	14	0,10	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 130, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: HYST_A, abdominelle Hysterektomie (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	60	2256	37	1,64	0,00	0,00	1,86
1	57	1329	52	3,91	0,00	0,00	5,88
2, 3	41	353	29	8,22	0,00	0,00	18,18
0, 1, 2, 3	60	3938	118	3,00	0,00	1,84	4,60

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	60	3938	66	1,68	0,00	0,00	2,62
A2	60	3938	21	0,53	0,00	0,00	0,00
A3	60	3938	31	0,79	0,00	0,00	1,10

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	60	2256	14	0,62	0,00	0,00	0,00
1	57	1329	29	2,18	0,00	0,00	2,38
2, 3	41	353	25	7,08	0,00	0,00	9,09
0, 1, 2, 3	60	3938	68	1,73	0,00	0,00	2,75

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	60	3938	32	0,81	0,00	0,00	0,87
A2	60	3938	14	0,36	0,00	0,00	0,00
A3	60	3938	22	0,56	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 200, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: HYST_V, vaginale Hysterektomie

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	54	2630	15	0,57	0,00	0,00	0,00
1	51	1402	8	0,57	0,00	0,00	0,00
2, 3	39	232	1	0,43	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	56	4264	24	0,56	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A3	56	4264	24	0,56	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	54	2630	4	0,15	0,00	0,00	0,00
1	51	1402	2	0,14	0,00	0,00	0,00
2, 3	39	232	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	56	4264	6	0,14	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A3	56	4264	6	0,14	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 112, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: KPRO, Knieendoprothese

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	344	118680	382	0,32	0,00	0,00	0,50
1	348	88730	477	0,54	0,00	0,21	0,70
2, 3	338	19516	204	1,05	0,00	0,00	1,42
0, 1, 2, 3	349	226926	1063	0,47	0,00	0,34	0,76

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	349	226926	226	0,10	0,00	0,00	0,16
A2, A3	349	226926	837	0,37	0,00	0,20	0,49

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	344	118680	50	0,04	0,00	0,00	0,00
1	348	88730	68	0,08	0,00	0,00	0,00
2, 3	338	19516	45	0,23	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	349	226926	163	0,07	0,00	0,00	0,06

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	349	226926	51	0,02	0,00	0,00	0,00
A2, A3	349	226926	112	0,05	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 93, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: KPRO_R, Knieendoprothese (Revisionseingriffe)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	70	1594	23	1,44	0,00	0,00	0,00
1	78	1791	38	2,12	0,00	0,00	0,00
2, 3	73	772	14	1,81	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	83	4157	75	1,80	0,00	0,00	2,21

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	83	4157	16	0,38	0,00	0,00	0,00
A2, A3	83	4157	59	1,42	0,00	0,00	1,54

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	70	1594	5	0,31	0,00	0,00	0,00
1	78	1791	12	0,67	0,00	0,00	0,00
2, 3	73	772	5	0,65	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	83	4157	22	0,53	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	83	4157	10	0,24	0,00	0,00	0,00
A2, A3	83	4157	12	0,29	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen:

1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 125, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: KRAN, Kraniotomie

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	36	5210	117	2,25	0,00	1,11	2,85
1	37	10695	273	2,55	0,30	1,82	2,97
2, 3	36	2013	78	3,87	0,00	2,49	5,13
0, 1, 2, 3	37	17918	468	2,61	0,93	2,27	3,66

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	37	17918	70	0,39	0,00	0,20	0,61
A2	37	17918	160	0,89	0,00	0,55	1,34
A3	37	17918	238	1,33	0,00	0,98	1,54

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	36	5210	22	0,42	0,00	0,00	0,48
1	37	10695	84	0,79	0,00	0,30	0,77
2, 3	36	2013	26	1,29	0,00	0,00	1,61
0, 1, 2, 3	37	17918	132	0,74	0,00	0,50	1,22

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	37	17918	27	0,15	0,00	0,00	0,23
A2	37	17918	26	0,15	0,00	0,00	0,24
A3	37	17918	79	0,44	0,00	0,12	0,50

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 202, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: LOBE, Lobektomie (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	37	1287	11	0,85	0,00	0,00	0,00
1	39	3080	31	1,01	0,00	0,00	1,04
2, 3	33	1065	14	1,31	0,00	0,00	1,08
0, 1, 2, 3	40	5432	56	1,03	0,00	0,00	1,54

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	40	5432	13	0,24	0,00	0,00	0,09
A2	40	5432	9	0,17	0,00	0,00	0,00
A3	40	5432	34	0,63	0,00	0,00	0,72

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	37	1287	7	0,54	0,00	0,00	0,00
1	39	3080	16	0,52	0,00	0,00	0,00
2, 3	33	1065	8	0,75	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	40	5432	31	0,57	0,00	0,00	0,91

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	40	5432	7	0,13	0,00	0,00	0,00
A2	40	5432	4	0,07	0,00	0,00	0,00
A3	40	5432	20	0,37	0,00	0,00	0,34

Anmerkungen:

1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 214, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: LOBE, Lobektomie (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	38	1371	8	0,58	0,00	0,00	0,00
1	44	3479	57	1,64	0,00	0,00	2,27
2, 3	43	1420	37	2,61	0,00	0,00	1,61
0, 1, 2, 3	44	6270	102	1,63	0,00	0,85	2,34

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	44	6270	25	0,40	0,00	0,00	0,42
A2	44	6270	16	0,26	0,00	0,00	0,11
A3	44	6270	61	0,97	0,00	0,00	1,25

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	38	1371	3	0,22	0,00	0,00	0,00
1	44	3479	39	1,12	0,00	0,00	1,33
2, 3	43	1420	25	1,76	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	44	6270	67	1,07	0,00	0,00	1,25

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	44	6270	13	0,21	0,00	0,00	0,00
A2	44	6270	8	0,13	0,00	0,00	0,00
A3	44	6270	46	0,73	0,00	0,00	0,68

Anmerkungen:

1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 212, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: LUMB, Lumbale Bandscheiben OP

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	88	20956	53	0,25	0,00	0,00	0,18
1	86	9058	50	0,55	0,00	0,00	0,56
2, 3	80	1995	23	1,15	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	88	32009	126	0,39	0,00	0,16	0,75

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	88	32009	35	0,11	0,00	0,00	0,06
A2	88	32009	52	0,16	0,00	0,00	0,25
A3	88	32009	39	0,12	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	88	20956	7	0,03	0,00	0,00	0,00
1	86	9058	16	0,18	0,00	0,00	0,00
2, 3	80	1995	10	0,50	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	88	32009	33	0,10	0,00	0,00	0,15

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	88	32009	9	0,03	0,00	0,00	0,00
A2	88	32009	11	0,03	0,00	0,00	0,00
A3	88	32009	13	0,04	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 96, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: MAST, Eingriffe an der Mamma

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	89	28935	202	0,70	0,00	0,32	0,97
1	88	20281	350	1,73	0,32	1,27	2,18
2, 3	83	2339	85	3,63	0,00	0,00	4,35
0, 1, 2, 3	90	51555	637	1,24	0,33	0,82	1,56

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	90	51555	353	0,68	0,00	0,46	0,79
A2, A3	90	51555	284	0,55	0,00	0,29	0,66

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	89	28935	16	0,06	0,00	0,00	0,00
1	88	20281	33	0,16	0,00	0,00	0,00
2, 3	83	2339	15	0,64	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	90	51555	64	0,12	0,00	0,00	0,16

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	90	51555	41	0,08	0,00	0,00	0,00
A2, A3	90	51555	23	0,04	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 90, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: NECK, Neck dissection

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	7	735	4	0,54	(a)	(a)	(a)
1, 2, 3	8	760	14	1,84	0,00	0,54	2,11
0, 1, 2, 3	8	1495	18	1,20	0,00	0,55	1,49

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	8	1495	10	0,67	0,00	0,11	1,08
A2	8	1495	8	0,54	0,00	0,22	0,52
A3	8	1495	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	7	735	0	0,00	(a)	(a)	(a)
1, 2, 3	8	760	8	1,05	0,00	0,00	1,11
0, 1, 2, 3	8	1495	8	0,54	0,00	0,00	0,61

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	8	1495	6	0,40	0,00	0,00	0,50
A2	8	1495	2	0,13	0,00	0,00	0,11
A3	8	1495	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen:

1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 370, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.
- (a) Datenmenge noch unzureichend

Referenzdaten

Operationsart: NEPH, Nephrektomie (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	42	2674	11	0,41	0,00	0,00	0,00
1	44	2626	22	0,84	0,00	0,00	0,91
2, 3	41	743	16	2,15	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	46	6043	49	0,81	0,00	0,00	1,20

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	46	6043	13	0,22	0,00	0,00	0,00
A2	46	6043	10	0,17	0,00	0,00	0,00
A3	46	6043	26	0,43	0,00	0,00	0,21

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	42	2674	4	0,15	0,00	0,00	0,00
1	44	2626	12	0,46	0,00	0,00	0,00
2, 3	41	743	13	1,75	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	46	6043	29	0,48	0,00	0,00	0,44

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	46	6043	5	0,08	0,00	0,00	0,00
A2	46	6043	6	0,10	0,00	0,00	0,00
A3	46	6043	18	0,30	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen:

1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 168, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: NEPH, Nephrektomie (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	43	1424	19	1,33	0,00	0,00	1,41
1	46	2023	27	1,33	0,00	0,00	2,13
2, 3	41	626	27	4,31	0,00	0,00	4,55
0, 1, 2, 3	47	4073	73	1,79	0,00	1,14	3,06

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	47	4073	34	0,83	0,00	0,00	2,17
A2	47	4073	21	0,52	0,00	0,00	0,60
A3	47	4073	18	0,44	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	43	1424	12	0,84	0,00	0,00	1,15
1	46	2023	22	1,09	0,00	0,00	2,04
2, 3	41	626	19	3,04	0,00	0,00	3,85
0, 1, 2, 3	47	4073	53	1,30	0,00	0,80	2,86

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	47	4073	27	0,66	0,00	0,00	2,04
A2	47	4073	14	0,34	0,00	0,00	0,43
A3	47	4073	12	0,29	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen:

1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 179, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: OSG, Eingriffe am oberen Sprunggelenk

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	47	6821	97	1,42	0,00	1,32	2,44
1	47	3818	97	2,54	0,00	1,56	3,88
2, 3	41	871	47	5,40	0,00	1,82	7,41
0, 1, 2, 3	47	11510	241	2,09	0,61	2,21	3,01

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	47	11510	61	0,53	0,00	0,22	0,97
A2, A3	47	11510	180	1,56	0,00	1,24	2,33

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	47	6821	3	0,04	0,00	0,00	0,00
1	47	3818	17	0,45	0,00	0,00	0,00
2, 3	41	871	11	1,26	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	47	11510	31	0,27	0,00	0,00	0,22

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	47	11510	15	0,13	0,00	0,00	0,00
A2, A3	47	11510	16	0,14	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 107, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: PARO, Parotidektomie

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	23	2911	30	1,03	0,00	0,63	1,69
1	23	1985	23	1,16	0,00	0,00	2,08
2, 3	23	473	9	1,90	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	23	5369	62	1,15	0,00	0,75	2,06

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	23	5369	44	0,82	0,00	0,75	1,33
A2, A3	23	5369	18	0,34	0,00	0,00	0,42

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	23	2911	7	0,24	0,00	0,00	0,36
1	23	1985	8	0,40	0,00	0,00	0,65
2, 3	23	473	3	0,63	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	23	5369	18	0,34	0,00	0,00	0,69

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	23	5369	12	0,22	0,00	0,00	0,48
A2, A3	23	5369	6	0,11	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 140, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: PRST, Prostatektomie (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	49	7913	79	1,00	0,00	0,00	0,90
1	50	4879	53	1,09	0,00	0,00	1,38
2, 3	44	959	14	1,46	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	51	13751	146	1,06	0,00	0,23	1,39

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	51	13751	31	0,23	0,00	0,00	0,32
A2	51	13751	7	0,05	0,00	0,00	0,00
A3	51	13751	108	0,79	0,00	0,00	0,80

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	49	7913	33	0,42	0,00	0,00	0,39
1	50	4879	18	0,37	0,00	0,00	0,00
2, 3	44	959	8	0,83	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	51	13751	59	0,43	0,00	0,00	0,51

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	51	13751	16	0,12	0,00	0,00	0,00
A2	51	13751	4	0,03	0,00	0,00	0,00
A3	51	13751	39	0,28	0,00	0,00	0,21

Anmerkungen:

1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 230, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: PRST, Prostatektomie (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	53	2242	53	2,36	0,00	0,00	1,80
1	53	1543	36	2,33	0,00	0,00	0,99
2, 3	31	336	17	5,06	0,00	0,00	5,41
0, 1, 2, 3	57	4121	106	2,57	0,00	0,00	2,91

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	57	4121	48	1,16	0,00	0,00	0,97
A2	57	4121	17	0,41	0,00	0,00	0,00
A3	57	4121	41	0,99	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	53	2242	16	0,71	0,00	0,00	0,00
1	53	1543	19	1,23	0,00	0,00	0,00
2, 3	31	336	12	3,57	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	57	4121	47	1,14	0,00	0,00	0,91

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	57	4121	26	0,63	0,00	0,00	0,00
A2	57	4121	5	0,12	0,00	0,00	0,00
A3	57	4121	16	0,39	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen:

1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 208, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: REKT, Rektum-Operationen (endoskopisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	58	975	38	3,90	0,00	0,00	3,77
1	58	1463	79	5,40	0,00	0,00	6,52
2, 3	45	653	60	9,19	0,00	2,44	10,34
0, 1, 2, 3	59	3091	177	5,73	0,00	2,47	8,00

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	59	3091	26	0,84	0,00	0,00	0,78
A2	59	3091	19	0,61	0,00	0,00	0,00
A3	59	3091	132	4,27	0,00	0,00	4,62

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	58	975	34	3,49	0,00	0,00	3,77
1	58	1463	71	4,85	0,00	0,00	5,43
2, 3	45	653	51	7,81	0,00	0,00	10,34
0, 1, 2, 3	59	3091	156	5,05	0,00	2,30	6,49

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	59	3091	23	0,74	0,00	0,00	0,00
A2	59	3091	17	0,55	0,00	0,00	0,00
A3	59	3091	116	3,75	0,00	0,00	4,62

Anmerkungen:

1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 246, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: REKT, Rektum-Operationen (offen chirurgisch)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	52	503	35	6,96	0,00	0,00	7,50
1	58	1096	112	10,22	0,00	3,49	14,29
2, 3	52	759	78	10,28	0,00	2,90	15,02
0, 1, 2, 3	61	2358	225	9,54	0,00	6,38	11,27

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	61	2358	84	3,56	0,00	0,00	3,33
A2	61	2358	29	1,23	0,00	0,00	0,00
A3	61	2358	112	4,75	0,00	0,98	6,41

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	52	503	29	5,77	0,00	0,00	4,94
1	58	1096	97	8,85	0,00	1,61	14,29
2, 3	52	759	72	9,49	0,00	2,90	13,15
0, 1, 2, 3	61	2358	198	8,40	0,00	5,26	10,53

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	61	2358	72	3,05	0,00	0,00	2,99
A2	61	2358	26	1,10	0,00	0,00	0,00
A3	61	2358	100	4,24	0,00	0,00	5,56

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 243, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: SECC, Sectio Caesarea

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	128	94896	596	0,63	0,16	0,56	0,92
1	126	51807	471	0,91	0,00	0,72	1,33
2, 3	112	6309	118	1,87	0,00	0,00	2,31
0, 1, 2, 3	129	153012	1185	0,77	0,30	0,67	1,14

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	129	153012	868	0,57	0,20	0,45	0,85
A2	129	153012	149	0,10	0,00	0,00	0,13
A3	129	153012	168	0,11	0,00	0,00	0,12

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	128	94896	71	0,07	0,00	0,00	0,07
1	126	51807	61	0,12	0,00	0,00	0,14
2, 3	112	6309	26	0,41	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	129	153012	158	0,10	0,00	0,03	0,16

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	129	153012	89	0,06	0,00	0,00	0,09
A2	129	153012	33	0,02	0,00	0,00	0,00
A3	129	153012	36	0,02	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 45, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: SECC, Sectio Caesarea (elektiv)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	123	60582	307	0,51	0,00	0,29	0,81
1	121	25116	196	0,78	0,00	0,41	1,23
2, 3	98	1880	36	1,91	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	125	87578	539	0,62	0,12	0,49	0,99

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	125	87578	420	0,48	0,00	0,28	0,73
A2	125	87578	63	0,07	0,00	0,00	0,08
A3	125	87578	56	0,06	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	123	60582	38	0,06	0,00	0,00	0,00
1	121	25116	27	0,11	0,00	0,00	0,00
2, 3	98	1880	4	0,21	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	125	87578	69	0,08	0,00	0,00	0,10

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	125	87578	42	0,05	0,00	0,00	0,00
A2	125	87578	18	0,02	0,00	0,00	0,00
A3	125	87578	9	0,01	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 46, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: SECC, Sectio Caesarea (Notfall)

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	122	27303	259	0,95	0,00	0,37	1,43
1	118	21015	247	1,18	0,00	0,00	1,43
2, 3	94	4158	84	2,02	0,00	0,00	1,86
0, 1, 2, 3	122	52476	590	1,12	0,00	0,72	1,59

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	122	52476	402	0,77	0,00	0,44	1,00
A2	122	52476	78	0,15	0,00	0,00	0,12
A3	122	52476	110	0,21	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	122	27303	28	0,10	0,00	0,00	0,00
1	118	21015	31	0,15	0,00	0,00	0,00
2, 3	94	4158	21	0,51	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	122	52476	80	0,15	0,00	0,00	0,16

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	122	52476	39	0,07	0,00	0,00	0,00
A2	122	52476	15	0,03	0,00	0,00	0,00
A3	122	52476	26	0,05	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 44, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: SPONDY, Spondylodese

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	101	15321	323	2,11	0,00	1,41	3,03
1	103	16622	643	3,87	1,08	3,18	5,26
2, 3	96	4618	278	6,02	0,00	4,27	9,33
0, 1, 2, 3	105	36561	1244	3,40	1,23	3,01	4,34

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	105	36561	205	0,56	0,00	0,31	0,95
A2	105	36561	637	1,74	0,00	1,01	2,37
A3	105	36561	402	1,10	0,00	0,39	1,70

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	101	15321	99	0,65	0,00	0,00	0,65
1	103	16622	313	1,88	0,00	0,85	3,01
2, 3	96	4618	144	3,12	0,00	0,85	4,95
0, 1, 2, 3	105	36561	556	1,52	0,00	1,01	2,25

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	105	36561	102	0,28	0,00	0,00	0,38
A2	105	36561	262	0,72	0,00	0,24	1,02
A3	105	36561	192	0,53	0,00	0,00	0,56

Anmerkungen:

1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 222, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: STRIP, Venöses Stripping

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	12	8797	50	0,57	0,00	0,22	1,26
1, 2, 3	12	5403	43	0,80	0,00	0,00	0,62
0, 1, 2, 3	12	14200	93	0,65	0,00	0,52	1,57

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	12	14200	89	0,63	0,00	0,03	0,97
A2, A3	12	14200	4	0,03	0,00	0,00	0,35

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	12	8797	2	0,02	0,00	0,00	0,00
1, 2, 3	12	5403	1	0,02	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	12	14200	3	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	12	14200	3	0,02	0,00	0,00	0,00
A2, A3	12	14200	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 75, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten

Operationsart: STRUM, Schilddrüsen-Eingriffe

Tabelle 1: **Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	41	19556	73	0,37	0,00	0,00	0,27
1, 2, 3	42	11284	67	0,59	0,00	0,00	0,71
0, 1, 2, 3	42	30840	140	0,45	0,00	0,19	0,60

Tabelle 2: **Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	42	30840	114	0,37	0,00	0,14	0,42
A2	42	30840	20	0,06	0,00	0,00	0,00
A3	42	30840	6	0,02	0,00	0,00	0,00

Tabelle 3: **Inhouse-Wundinfektionsraten** je Risikokategorie

Risikokategorie	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
0	41	19556	19	0,10	0,00	0,00	0,00
1, 2, 3	42	11284	16	0,14	0,00	0,00	0,00
0, 1, 2, 3	42	30840	35	0,11	0,00	0,00	0,00

Tabelle 4: **Inhouse-Wundinfektionsraten** nach Art der Infektion

Wundinfektionsart	Anzahl Abteilungen	Anzahl Operationen	Anzahl Wundinfektionen	Inhouse-Wundinfektionsrate			
				gepoolter arithm.Mittelwert	25%-Quantil	Median	75%-Quantil
A1	42	30840	25	0,08	0,00	0,00	0,00
A2	42	30840	9	0,03	0,00	0,00	0,00
A3	42	30840	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Anmerkungen: 1. Risikokategorie (je ein Punkt) für: Op-Dauer(in Minuten) > 106, Wundklassifikation > 2 und ASA-Score > 2.

Referenzdaten - Erregerstatistik der häufigsten Erreger

Indikator-OP Gruppe Allgemeinchirurgie

Anzahl Infektionen insgesamt 520

Anzahl Infektionen mit Erregerangabe 269

Erregerangaben im Rahmen von Infektionen 583

Tabelle 5.1.1: Anzahl Infektionen in der angegebenen Erregergruppe

	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Erregergruppe		
Bacterium	265	50,96
Fungus	8	1,54
Gram-Charakteristika		
Gram-positive	224	43,08
Gram-negative	63	12,12
MRE		
MRSA	5	0,96
VRE	2	0,38
3MRGN	2	0,38
4MRGN	0	0,00

Tabelle 5.1.2: Anzahl Infektionen für die angegebenen Genera und Spezies (Top 5)

Erreger	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Staphylococcus spp.	174	33,46
- davon Staphylococcus aureus	118	22,69
-- davon MRSA	5	0,96
- davon Staphylococcus epidermidis	43	8,27
- davon Staphylococcus capitis	4	0,77
- davon Staphylococcus haemolyticus	4	0,77
- davon andere Staphylococcus spp.*	5	0,96
Streptococcus spp.	25	4,81
- davon Streptococcus anginosus	8	1,54
- davon Streptococcus intermedius	4	0,77
- davon Streptococcus constellatus	3	0,58
- davon Streptococcus pyogenes	3	0,58
- davon andere Streptococcus spp.*	7	1,35
Escherichia spp.	25	4,81
- davon Escherichia coli	25	4,81
Enterococcus spp.	18	3,46
- davon Enterococcus faecalis	11	2,12
- davon Enterococcus faecium	7	1,35
-- davon VRE	2	0,38
Klebsiella spp.	13	2,50
- davon Klebsiella pneumoniae	8	1,54
-- davon 3MRGN	1	0,19
- davon Klebsiella oxytoca	6	1,15

*Enthält seltenere und nicht näher spezifizierte Spezies dieses Genus

Referenzdaten - Erregerstatistik der häufigsten Erreger

Indikator-OP Gruppe

Abdominalchirurgie

Anzahl Infektionen insgesamt

5600

Anzahl Infektionen mit Erregerangabe

3576

Erregerangaben im Rahmen von Infektionen

8574

Tabelle 5.2.1: Anzahl Infektionen in der angegebenen Erregergruppe

	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Erregergruppe		
Bacterium	3507	62,62
Fungus	257	4,59
Gram-Charakteristika		
Gram-positive	2146	38,32
Gram-negative	2599	46,41
MRE		
MRSA	20	0,36
VRE	117	2,09
3MRGN	194	3,46
4MRGN	11	0,20

Tabelle 5.2.2: Anzahl Infektionen für die angegebenen Genera und Spezies (Top 5)

Erreger	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Escherichia spp.	1678	29,96
- davon Escherichia coli	1673	29,88
-- davon 3MRGN	160	2,86
-- davon 4MRGN	4	0,07
- davon andere Escherichia spp.*	5	0,09
Enterococcus spp.	1575	28,12
- davon Enterococcus faecium	881	15,73
-- davon VRE	110	1,96
- davon Enterococcus faecalis	706	12,61
-- davon VRE	7	0,12
- davon Enterococcus avium	79	1,41
- davon Enterococcus gallinarum	25	0,45
Klebsiella spp.	426	7,61
- davon Klebsiella pneumoniae	267	4,77
-- davon 3MRGN	19	0,34
-- davon 4MRGN	2	0,04
- davon Klebsiella oxytoca	146	2,61
-- davon 3MRGN	3	0,05
- davon Klebsiella variicola	1	0,02
- davon andere Klebsiella spp.*	12	0,21
Staphylococcus spp.	404	7,21
- davon Staphylococcus epidermidis	160	2,86
- davon Staphylococcus aureus	152	2,71
-- davon MRSA	20	0,36
- davon Staphylococcus haemolyticus	29	0,52
- davon Staphylococcus lugdunensis	23	0,41
- davon andere Staphylococcus spp.*	40	0,71
Bacteroides spp.	342	6,11
- davon Bacteroides fragilis	195	3,48
- davon Bacteroides thetaiotaomicron	61	1,09
- davon Bacteroides ovatus	30	0,54
- davon Bacteroides vulgatus	23	0,41
- davon andere Bacteroides spp.*	33	0,59

*Enthält seltenere und nicht näher spezifizierte Spezies dieses Genus

Referenzdaten - Erregerstatistik der häufigsten Erreger

Indikator-OP Gruppe

Traumatologie

Anzahl Infektionen insgesamt

6449

Anzahl Infektionen mit Erregerangabe

4985

Erregerangaben im Rahmen von Infektionen

7814

Tabelle 5.3.1: Anzahl Infektionen in der angegebenen Erregergruppe

	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Erregergruppe		
Bacterium	4974	77,13
Fungus	24	0,37
Gram-Charakteristika		
Gram-positive	4192	65,00
Gram-negative	1181	18,31
MRE		
MRSA	71	1,10
VRE	18	0,28
3MRGN	35	0,54
4MRGN	0	0,00

Tabelle 5.3.2: Anzahl Infektionen für die angegebenen Genera und Spezies (Top 5)

Erreger	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Staphylococcus spp.	3303	51,22
- davon Staphylococcus aureus	1562	24,22
-- davon MRSA	71	1,10
- davon Staphylococcus epidermidis	1183	18,34
- davon Staphylococcus capitis	192	2,98
- davon Staphylococcus haemolyticus	192	2,98
- davon andere Staphylococcus spp.*	174	2,70
Enterococcus spp.	477	7,40
- davon Enterococcus faecalis	378	5,86
-- davon VRE	3	0,05
- davon Enterococcus faecium	94	1,46
-- davon VRE	16	0,25
- davon Enterococcus avium	3	0,05
- davon Enterococcus gallinarum	2	0,03
Escherichia spp.	337	5,23
- davon Escherichia coli	335	5,19
-- davon 3MRGN	20	0,31
- davon Escherichia hermannii	1	0,02
- davon andere Escherichia spp.*	1	0,02
Streptococcus spp.	331	5,13
- davon Streptococcus dysgalactiae	106	1,64
- davon Streptococcus agalactiae	88	1,36
- davon Streptococcus pyogenes	15	0,23
- davon Streptococcus oralis	11	0,17
- davon andere Streptococcus spp.*	111	1,72
Enterobacter spp.	243	3,77
- davon Enterobacter cloacae	161	2,50
-- davon 3MRGN	2	0,03
- davon Enterobacter aerogenes	16	0,25
- davon Enterobacter hormaechei	14	0,22
- davon Enterobacter intermedius	2	0,03
- davon andere Enterobacter spp.*	50	0,78

*Enthält seltenere und nicht näher spezifizierte Spezies dieses Genus

Referenzdaten - Erregerstatistik der häufigsten Erreger

Indikator-OP Gruppe

Urologie

Anzahl Infektionen insgesamt

374

Anzahl Infektionen mit Erregerangabe

247

Erregerangaben im Rahmen von Infektionen

467

Tabelle 5.4.1: Anzahl Infektionen in der angegebenen Erregergruppe

	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Erregergruppe		
Bacterium	242	64,71
Fungus	9	2,41
Gram-Charakteristika		
Gram-positive	159	42,51
Gram-negative	121	32,35
MRE		
MRSA	4	1,07
VRE	1	0,27
3MRGN	10	2,67
4MRGN	1	0,27

Tabelle 5.4.2: Anzahl Infektionen für die angegebenen Genera und Spezies (Top 5)

Erreger	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Staphylococcus spp.	87	23,26
- davon Staphylococcus aureus	40	10,70
-- davon MRSA	4	1,07
- davon Staphylococcus epidermidis	20	5,35
- davon Staphylococcus haemolyticus	8	2,14
- davon Staphylococcus lugdunensis	7	1,87
- davon andere Staphylococcus spp.*	12	3,21
Enterococcus spp.	68	18,18
- davon Enterococcus faecalis	53	14,17
- davon Enterococcus faecium	15	4,01
-- davon VRE	1	0,27
- davon Enterococcus avium	1	0,27
Escherichia spp.	58	15,51
- davon Escherichia coli	58	15,51
-- davon 3MRGN	7	1,87
Klebsiella spp.	25	6,68
- davon Klebsiella pneumoniae	13	3,48
-- davon 3MRGN	1	0,27
- davon Klebsiella oxytoca	8	2,14
-- davon 3MRGN	1	0,27
- davon andere Klebsiella spp.*	4	1,07
Pseudomonas spp.	17	4,55
- davon Pseudomonas aeruginosa	17	4,55
-- davon 3MRGN	1	0,27

*Enthält seltenere und nicht näher spezifizierte Spezies dieses Genus

Referenzdaten - Erregerstatistik der häufigsten Erreger

Indikator-OP Gruppe

Gynäkologie

Anzahl Infektionen insgesamt

2052

Anzahl Infektionen mit Erregerangabe

1224

Erregerangaben im Rahmen von Infektionen

2573

Tabelle 5.5.1: Anzahl Infektionen in der angegebenen Erregergruppe

	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Erregergruppe		
Bacterium	1222	59,55
Fungus	12	0,58
Gram-Charakteristika		
Gram-positive	883	43,03
Gram-negative	541	26,36
MRE		
MRSA	31	1,51
VRE	1	0,05
3MRGN	26	1,27
4MRGN	2	0,10

Tabelle 5.5.2: Anzahl Infektionen für die angegebenen Genera und Spezies (Top 5)

Erreger	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Staphylococcus spp.	598	29,14
- davon Staphylococcus aureus	370	18,03
-- davon MRSA	31	1,51
- davon Staphylococcus epidermidis	134	6,53
- davon Staphylococcus lugdunensis	53	2,58
- davon Staphylococcus capitis	11	0,54
- davon andere Staphylococcus spp.*	30	1,46
Escherichia spp.	224	10,92
- davon Escherichia coli	222	10,82
-- davon 3MRGN	17	0,83
-- davon 4MRGN	2	0,10
- davon Escherichia vulneris	2	0,10
Enterococcus spp.	169	8,24
- davon Enterococcus faecalis	148	7,21
-- davon VRE	1	0,05
- davon Enterococcus faecium	16	0,78
- davon Enterococcus avium	2	0,10
- davon Enterococcus durans	1	0,05
- davon andere Enterococcus spp.*	2	0,10
Proteus spp.	93	4,53
- davon Proteus mirabilis	85	4,14
-- davon 3MRGN	2	0,10
- davon Proteus vulgaris	4	0,19
- davon Proteus penneri	1	0,05
- davon andere Proteus spp.*	3	0,15
Streptococcus spp.	85	4,14
- davon Streptococcus anginosus	24	1,17
- davon Streptococcus agalactiae	21	1,02
- davon Streptococcus dysgalactiae	8	0,39
- davon Streptococcus pyogenes	8	0,39
- davon andere Streptococcus spp.*	24	1,17

*Enthält seltenere und nicht näher spezifizierte Spezies dieses Genus

Referenzdaten - Erregerstatistik der häufigsten Erreger

Indikator-OP Gruppe Herzchirurgie

Anzahl Infektionen insgesamt 1301

Anzahl Infektionen mit Erregerangabe 1043

Erregerangaben im Rahmen von Infektionen 1715

Tabelle 5.6.1: Anzahl Infektionen in der angegebenen Erregergruppe

	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Erregergruppe		
Bacterium	1034	79,48
Fungus	20	1,54
Gram-Charakteristika		
Gram-positive	798	61,34
Gram-negative	374	28,75
MRE		
MRSA	19	1,46
VRE	9	0,69
3MRGN	9	0,69
4MRGN	2	0,15

Tabelle 5.6.2: Anzahl Infektionen für die angegebenen Genera und Spezies (Top 5)

Erreger	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Staphylococcus spp.	673	51,73
- davon Staphylococcus epidermidis	344	26,44
- davon Staphylococcus aureus	295	22,67
-- davon MRSA	19	1,46
- davon Staphylococcus lugdunensis	12	0,92
- davon Staphylococcus haemolyticus	10	0,77
- davon andere Staphylococcus spp.*	12	0,92
Enterococcus spp.	100	7,69
- davon Enterococcus faecalis	61	4,69
- davon Enterococcus faecium	39	3,00
-- davon VRE	9	0,69
- davon Enterococcus raffinosus	1	0,08
Escherichia spp.	94	7,23
- davon Escherichia coli	94	7,23
-- davon 3MRGN	4	0,31
Enterobacter spp.	91	6,99
- davon Enterobacter cloacae	52	4,00
- davon Enterobacter aerogenes	20	1,54
- davon Enterobacter hormaechei	5	0,38
- davon Enterobacter asburiae	2	0,15
- davon andere Enterobacter spp.*	12	0,92
Klebsiella spp.	85	6,53
- davon Klebsiella pneumoniae	61	4,69
-- davon 3MRGN	4	0,31
-- davon 4MRGN	1	0,08
- davon Klebsiella oxytoca	23	1,77
- davon andere Klebsiella spp.*	1	0,08

*Enthält seltenere und nicht näher spezifizierte Spezies dieses Genus

Referenzdaten - Erregerstatistik der häufigsten Erreger

Indikator-OP Gruppe

Gefäßchirurgie

Anzahl Infektionen insgesamt

1410

Anzahl Infektionen mit Erregerangabe

1160

Erregerangaben im Rahmen von Infektionen

2075

Tabelle 5.7.1: Anzahl Infektionen in der angegebenen Erregergruppe

	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Erregergruppe		
Bacterium	1158	82,13
Fungus	5	0,35
Gram-Charakteristika		
Gram-positive	815	57,80
Gram-negative	614	43,55
MRE		
MRSA	17	1,21
VRE	5	0,35
3MRGN	20	1,42
4MRGN	1	0,07

Tabelle 5.7.2: Anzahl Infektionen für die angegebenen Genera und Spezies (Top 5)

Erreger	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Staphylococcus spp.	575	40,78
- davon Staphylococcus aureus	348	24,68
-- davon MRSA	17	1,21
- davon Staphylococcus epidermidis	146	10,35
- davon Staphylococcus lugdunensis	30	2,13
- davon Staphylococcus haemolyticus	24	1,70
- davon andere Staphylococcus spp.*	27	1,91
Enterococcus spp.	233	16,52
- davon Enterococcus faecalis	172	12,20
- davon Enterococcus faecium	62	4,40
-- davon VRE	5	0,35
- davon Enterococcus gallinarum	1	0,07
- davon Enterococcus raffinosus	1	0,07
Escherichia spp.	206	14,61
- davon Escherichia coli	205	14,54
-- davon 3MRGN	12	0,85
- davon Escherichia hermannii	1	0,07
Proteus spp.	121	8,58
- davon Proteus mirabilis	112	7,94
- davon Proteus vulgaris	5	0,35
- davon Proteus penneri	1	0,07
- davon andere Proteus spp.*	3	0,21
Pseudomonas spp.	110	7,80
- davon Pseudomonas aeruginosa	105	7,45
-- davon 3MRGN	1	0,07
- davon Pseudomonas fluorescens	2	0,14
- davon Pseudomonas putida	2	0,14
- davon Pseudomonas stutzeri	1	0,07

*Enthält seltenere und nicht näher spezifizierte Spezies dieses Genus

Referenzdaten - Erregerstatistik der häufigsten Erreger

Indikator-OP Gruppe Neurochirurgie

Anzahl Infektionen insgesamt 1703

Anzahl Infektionen mit Erregerangabe 1324

Erregerangaben im Rahmen von Infektionen 2070

Tabelle 5.8.1: Anzahl Infektionen in der angegebenen Erregergruppe

	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Erregergruppe		
Bacterium	1320	77,51
Fungus	6	0,35
Gram-Charakteristika		
Gram-positive	1091	64,06
Gram-negative	329	19,32
MRE		
MRSA	12	0,70
VRE	3	0,18
3MRGN	12	0,70
4MRGN	1	0,06

Tabelle 5.8.2: Anzahl Infektionen für die angegebenen Genera und Spezies (Top 5)

Erreger	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Staphylococcus spp.	830	48,74
- davon Staphylococcus aureus	426	25,01
-- davon MRSA	12	0,70
- davon Staphylococcus epidermidis	335	19,67
- davon Staphylococcus capitis	41	2,41
- davon Staphylococcus hominis	25	1,47
- davon andere Staphylococcus spp.*	3	0,18
Propionibacterium spp.	168	9,86
- davon Propionibacterium acnes	156	9,16
- davon Propionibacterium avidum	7	0,41
- davon Propionibacterium granulosum	1	0,06
- davon andere Propionibacterium spp.*	4	0,23
Escherichia spp.	107	6,28
- davon Escherichia coli	107	6,28
-- davon 3MRGN	5	0,29
Enterococcus spp.	96	5,64
- davon Enterococcus faecalis	69	4,05
- davon Enterococcus faecium	25	1,47
-- davon VRE	3	0,18
- davon Enterococcus gallinarum	1	0,06
- davon Enterococcus raffinosus	1	0,06
Enterobacter spp.	69	4,05
- davon Enterobacter cloacae	41	2,41
-- davon 3MRGN	2	0,12
- davon Enterobacter aerogenes	15	0,88
- davon Enterobacter hormaechei	6	0,35
-- davon 3MRGN	1	0,06
- davon andere Enterobacter spp.*	7	0,41

*Enthält seltenere und nicht näher spezifizierte Spezies dieses Genus

Referenzdaten - Erregerstatistik der häufigsten Erreger

Indikator-OP Gruppe	Gesamt
Anzahl Infektionen insgesamt	17706
Anzahl Infektionen mit Erregerangabe	12504
Erregerangaben im Rahmen von Infektionen	23801

Tabelle 5.9.1: Anzahl Infektionen in der angegebenen Erregergruppe

	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Erregergruppe		
Bacterium	12402	70,04
Fungus	335	1,89
Gram-Charakteristika		
Gram-positive	9217	52,06
Gram-negative	5493	31,02
MRE		
MRSA	167	0,94
VRE	153	0,86
3MRGN	296	1,67
4MRGN	17	0,10

Tabelle 5.9.2: Anzahl Infektionen für die angegebenen Genera und Spezies (Top 5)

Erreger	Anzahl	Pro 100 Infektionen
Staphylococcus spp.	5814	32,84
- davon Staphylococcus aureus	2885	16,29
-- davon MRSA	167	0,94
- davon Staphylococcus epidermidis	2030	11,47
- davon Staphylococcus haemolyticus	277	1,56
- davon Staphylococcus capitis	233	1,32
- davon andere Staphylococcus spp.*	389	2,20
Enterococcus spp.	2640	14,91
- davon Enterococcus faecalis	1529	8,64
-- davon VRE	11	0,06
- davon Enterococcus faecium	1114	6,29
-- davon VRE	143	0,81
- davon Enterococcus avium	85	0,48
- davon Enterococcus gallinarum	28	0,16
Escherichia spp.	2622	14,81
- davon Escherichia coli	2612	14,75
-- davon 3MRGN	220	1,24
-- davon 4MRGN	6	0,03
- davon Escherichia vulneris	2	0,01
- davon Escherichia hermannii	2	0,01
- davon andere Escherichia spp.*	6	0,03
Klebsiella spp.	855	4,83
- davon Klebsiella pneumoniae	561	3,17
-- davon 3MRGN	38	0,21
-- davon 4MRGN	4	0,02
- davon Klebsiella oxytoca	270	1,52
-- davon 3MRGN	5	0,03
- davon Klebsiella variicola	3	0,02
- davon andere Klebsiella spp.*	21	0,12
Streptococcus spp.	748	4,22
- davon Streptococcus agalactiae	153	0,86
- davon Streptococcus dysgalactiae	144	0,81
- davon Streptococcus anginosus	135	0,76
- davon Streptococcus constellatus	40	0,23
- davon andere Streptococcus spp.*	276	1,56

Referenzdaten - Erregerstatistik der häufigsten Erreger

Tabelle 6: Definitionen der Indikator-OP Gruppierung aus Tabelle 5

Allgemeinchirurgie: HERN, LOBE, STRUM, PARO, NECK

Abdominalchirurgie: APPE, COLO, CHOL, REKT, APPE_Ki

Traumatologie / Orthopädie: ART, FPF_G, FPF_O, HPRO_A, HPRO_F, KPRO, LUMB, OSG, HALLUX, HPRO_R, KPRO_R

Urologie: NEPH, PRST

Gynäkologie: HYST_A, HYST_V, MAST, SECC

Herzchirurgie: COBY_L, COBY_T, CARD

Gefäßchirurgie: GC_ABD, GC_CAR, GC_EXT, STRIP

Neurochirurgie: KRAN, SPONDY